# Cojín Antiescaras Kineris



**Marca:** Winncare

**0.00 €**

10% IVA incl.

| |
|---|
| Portes gratis a partir de 90 eur. |
| Certificado CE (Conformidad Europea) |
| Todos los productos se entregan listos para su uso |

# Winncare KINERIS™: Cojín neumático para muy alto riesgo de úlceras por presión

El **KINERIS™** de **Winncare** es un **cojín terapéutico de celdas de aire individualmente deformables y regulables**, indicado para usuarios con **riesgo muy alto de desarrollar úlceras por presión**. Su sistema neumático favorece la inmersión de las zonas de apoyo y ayuda a reducir las presiones y las fuerzas de cizallamiento durante periodos prolongados de sedestación.

## Adaptación a la morfología del usuario

Las celdas se adaptan de forma independiente al cuerpo, permitiendo ajustar la presión del cojín según la morfología del usuario. Se suministra con **manómetro de presión** y una tabla de equivalencias peso/presión para facilitar un inflado adecuado. No debe inflarse por encima de **100 mmHg**.

## Versión mono o bicompartimento

El KINERIS™ está disponible en dos configuraciones. El modelo **monocompartimento** está destinado a usuarios sin apoyo asimétrico significativo, mientras que el **bicompartimento** permite realizar ajustes diferenciados para ayudar a compensar **desequilibrios pélvicos o problemas de estabilidad**.

## Reducción de presión y mejor microclima

El movimiento del aire entre las celdas acompaña los cambios posturales del usuario y favorece una distribución más homogénea de la presión. La circulación de aire entre las bases de las celdas también ayuda a **reducir la maceración y mejorar el microclima** durante la sedestación.

# Funda integral extraíble

La funda actual es **extraíble y dispone de base antideslizante**. Está fabricada con tejido transpirable y elástico, resistente a la abrasión, al moho y a la luz UV, además de contar con certificación **Oeko-Tex® Clase 1**. El lavado habitual indicado es a **40 °C**, permitiéndose un lavado puntual a **90 °C**.

* El médico debe asegurarse que el paciente o su entorno puedan hacer los ajustes del soporte. Es necesario que el médico haga las verificaciones oportunas después de 1 mes de uso.